ABSTRAK

Arifudin (**2016**) Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Depresi Pada Lansia Di PSTW Kabupaten Gowa, Program studi kesehatan masyarakat, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia Timur. Dibimbing oleh **Dr. Jangga. S.Si.,M.Kes.,Apt** dan **Dr. Risma Haris. S.Si.,M.Si**

Kejadian depresi pada lansia seringkali tidak terdeteksi, salah didiagnosis, atau tidak ditangani dengan baik. Gejala depresi seringkali dihubungkan dengan masalah medis dalam proses penuaan, bukan sebagai tanda dari depresi itu sendiri. Dampak depresi pada lansia sangatlah buruk. Depresi yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan peningkatan penggunaan fasilitas kesehatan, pengaruh negatif terhadap kualitas hidup lansia, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah desain peneltian observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional *(transversal)*. Instrumen yang di gunakan dalampenelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah alat ukur yang berupa angket atau kuesioner. Populasi adalah semua semua lansia yang berada PSTW Kabupaten Gowa. Sebanyak 100 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Analisis Univariat, Analisis Bivariat dan Analisa Multivariat. Hasil penelitian menunjukan bahwa analisa Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Depresi Pada Lansia Di PSTW Kabupaten Gowa adalah kondisi fisik (q = 0.00), dukungan keluarga (q = 0.01), usia (q = 0.01), stres (q = 0.01).

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dari keempat variabel tersebut memiliki hubungan yang bermakna antara kondisi fisik, dukungan keluarga, usia, dan stress, akan tetapi dari keempat variabel tersebut yang paling besar hubungan atau pengaruhnya dengan kejadian depresi pada lansia di PSTW Kabupaten Gowa yaitu: Dukungan Keluarga

Kata Kunci : Lansia, Depresi, Faktor Sosial
Pustaka : (2014-2019)



ABSTRACT

Arifudin (2016) The Factors Related to The Incidence of Depression In Elderly In PSTW Gowa Regency, Public Health Study Program, Postgraduate Program, University of East Indonesia. Guided by Dr. Jangga. S.Si.,M.Kes.,Apt and Dr. Risma Haris. S.Si.,M.Si

The incidence of depression in the elderly is often undetectable, misdiagnosed, or poorly handled. Symptoms of depression are often associated with medical problems in the aging process, not as a sign of depression itself. The impact of depression on the elderly is very bad. Depression that is not handled properly can lead to increased use of health facilities, negative influence on the quality of life of the elderly, can even lead to death.

The type of research used is the design of analytical observational research using a cross sectional (transverse) approach. The instruments used in this research are questionnaires. Questionnaire is a measuring instrument in the form of questionnaires. The population is all elderly who are in PSTW Gowa Regency. As many as 100 people. Samples in this study as many as 50 respondents. Data analysis used in this study Univariate Analysis, Bivariate Analysis and Multivariate Analysis. The results showed that the analysis of Factors Related to Depression in Elderly In PSTW Gowa Regency is physical condition (q = 0.00), family support (q = 0.01), age (q = 0.01), stress (q = 0.01).

The conclusion in this study is that the four variables have a meaningful relationship between physical condition, family support, age, and stress, but of the four variables that have the most relationship or effect with the incidence of depression in the elderly in PSTW Gowa Regency are: Family Support

Keywords : Elderly, Depression, Social Factors
Library : (2014-2019)